Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der einzelnen Inhalte der Vorlesung 61-020 „Einführung in die Pflanzenphysiologie“ kann keine Gewähr übernommen werden.

Es ist nicht gestattet, diese Vorlesung oder Teile dieser Vorlesung ohne ausdrückliche Genehmigung der Dozentinnen und Dozenten für die Wiedergabe im Druck, Vorträge oder eine andere Art der Veröffentlichung, auch nicht im Internet, zu verwenden. Für Teile der Abbildungen liegen die Rechte bei Buchverlagen, wissenschaftlichen Zeitschriften oder bei den Dozentinnen und Dozenten dieser Veranstaltung.

Hamburg, 16.01. 2023 Prof. Stefan Hoth

Geplanter Ablauf der Vorlesung

17. Oktober 2022	Wasserhaushalt
24. Oktober 2022	Mineralstoffernährung
7. November 2022	Mineralstoffernährung/ Bodenkunde
14. November 2022	Photosynthese
21. November 2022	Photosynthese
28. November 2022	Photosynthese
5. Dezember 2022	Photosynthese
12. Dezember 2022	Photosynthese
19. Dezember 2022	Pflanzenhormone
9. Januar 2023	Pflanzenhormone
16. Januar 2023	Pflanzenhormone
23. Januar 2023	Photosynthese/ Licht als Entwicklungsstimulus
30. Januar 2023	Licht als Entwicklungsstimulus


Entdeckung
molekularer Wirkmechanismus
Struktur
Gibberelline
physiologische Funktionen
Biosynthese
Verteilung

Entdeckung der Gibberelline (GAs)

„Verrückter Reis" (bakanae)



(Taiz & Zeiger, Plant Physiology)

- Krankheit verursacht ...
  - ... hohen Wuchs ("verrückter Reis")
  - ... kein Fruchtansatz
  - ... durch den Pilz ***Gibberela fujikuroi***

- 1930: in Japan aus Pilzkulturen Wirkstoffe isoliert ⇒ **Gibberellin (GA)**
- 1958: GA-Isolierung erstmalig aus Pflanzen
- heute >100 GAs bekannt; nach der Reihenfolge ihrer Entdeckung numeriert (GA_1, GA_2 ...)


Entdeckung
molekularer Wirkmechanismus
Struktur
Gibberelline
physiologische Funktionen
Biosynthese
Verteilung

Die chemische Natur von Gibberellinen

C_{20}-GAs *(inaktiv)*

oder

C_{19}-GAs: Lacton C_{19}-C_{10}

Unterschiede:

Oxidationsstufe am C_{20}

OH-Gruppen im Molekül



C_{20}-gibberellin



C_{19}-gibberellin

Aktive Gibberelline

GA_1 ist das häufigste aktive GA in Pflanzen



(E) **Gibberellin A_1 (GA_1)**



(F) **Gibberellic acid (GA_3)**



(G) **Gibberellin A_4 (GA_4)**

GA_3 ist das aktivste GA in *Gibberella fujikuroi*

(Buchanan, Gruissem, Jones
Biochemistry and Molecular Biology of Plants)


Entdeckung
molekularer Wirkmechanismus
Struktur
Gibberelline
physiologische Funktionen
Biosynthese
Verteilung

Die Biosynthese von Gibberellinen

Gemeinsamkeiten mit Biosynthesen anderer Phytohormone



Die Biosynthese von Gibberellinen

GA-defiziente Mutanten weisen Zwergwuchs auf





Negative feedback regulation: GA represses GA20ox and GA3ox genes

Positive feedback regulation: GA induces GA2ox gene


Entdeckung
molekularer Wirkmechanismus
Struktur
Gibberelline
physiologische Funktionen
Biosynthese
Verteilung

Effekte von Gibberellinen

GAs regulieren das Sproßwachstum

Gregor Mendel (1866)
Höhenwachstum der Erbse

Selektion hoher und zwergwüchsiger Pflanzen

- unterschiedliche GA-Gehalte *(verbesserte Nachweismethoden)*
  - Identifizierung des verantwortlichen Gens: *Le*



- zwergwüchsige Pflanzen reagieren nicht auf GA_{20} *(Vorstufe)* aber auf GA_1 *(aktiv)*
- *Le*-Gen katalysiert $GA_{20} \Rightarrow GA_1$ -Umbau

Effekte von Gibberellinen

GA steigert Sproßwachstum

GA beeinflußt Blühinduktion

GA fördert die Samenkeimung

GA fördert den Fruchtansatz *(Beginn der Fruchtbildung nach Bestäubung)*

GA regelt Übergang vom Juvenil- zum Reifestadium *(Blüte nur im Reifestadium)*



dwarf1 wt

GA - + + - - - +. +



Zwerg-Mais Kohl Zwerg-Erbse

GA-Effekt auf Blühinduktion

- GA + GA + Kälte
- Kälte


Entdeckung
molekularer Wirkmechanismus
Struktur
Gibberelline
physiologische Funktionen
Biosynthese
Verteilung

Der molekulare Wirkmechanismus

Mechanismus der GA-Wirkung bei der

1. Förderung der Samenkeimung

2. Förderung des Sproßwachstums

Der molekulare Wirkmechanismus

Samenkeimung: Mobilisierung von Reservestoffen aus dem Endosperm

- Sekretion der α-und β-Amylasen nur in Anwesenheit des Embryos (Haberlandt, 1890)
- GA kann Embryo ersetzen (1960)
- Nachweis von GA_1-Synthese im Embryo, Abgabe ins Endosperm (Lenton et al., 1994)



Der molekulare Wirkmechanismus

Mobilisierung von Reservestoffen aus dem Endosperm



Vorgänge während der Keimung im Gerstenkorn

Aus: Strasburger, *Lehrbuch der Botanik, 36. Aufl.*
© Spektrum Akademischer Verlag GmbH 2008

1. Coleoptile und Scutellum synthetisieren GA und entlassen es in das Endosperm.
2. Gibberelin diffundiert in die Aleuronschicht und aktiviert dort Genexpression.
3. Amylasen und andere Hydrolasen werden gebildet und sezerniert
4. Amylasen und andere Hydrolasen bauen Stärke ab.
5. Lösliche Abbauprodukte werden in den wachsenden Keimling transportiert.

Der molekulare Wirkmechanismus

Stärkeabbau durch GA-induzierte Amylase





Stärkeabbau durch GA-induzierte Amylase

sezerniert von Embryo-haltiger Hälfte in Weizenkörnern

Der molekulare Wirkmechanismus

Typen von GA-Mutanten in *Arabidopsis thaliana*



Der molekulare Wirkmechanismus

GA-Signaltransduktion



Zusammenfassung:

"verrückter Reis"

Gibberelline

Entdeckung

GA_1



tetracyclische Diterpensäuren

Struktur

Biosynthese

3 Stufen
in versch. Kompartimenten

Verteilung

im Phloem
Zwischenstufen?

physiologische Funktionen

Internodienstreckung
Samenkeimung
Blühinduktion
Geschlechtsbestimmung
Fruchtansatz

molekularer Wirkmechanismus

GA-GID1-DELLA
Mechanismus